

Sapillo pintojo ibérico – *Discoglossus galganoi* Capula, Nascetti, Lanza, Bullini y Crespo, 1985

Íñigo Martínez-Solano
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)

Fecha de publicación: 25-03-2003

Versión 29-11-2006



Individuo con bandas dorsales longitudinales. © Íñigo Martínez-Solano.

Identificación


Sapillo de aspecto similar a una rana y pequeño a mediano tamaño (generalmente, entre 45 y 65 mm, excepcionalmente hasta 80 mm de talla). El tímpano es poco conspicuo. La coloración es muy variable, pero generalmente predominan tonos pardos más o menos oscuros, amarillentos o verdosos sobre los que se disponen de manera irregular manchas más oscuras con rebordes claros o, ocasionalmente, tres bandas longitudinales, una central y dos laterales, que recorren todo el dorso. Sin tubérculos subarticulares. Extremidades posteriores relativamente cortas y con membranas interdigitales reducidas.

Estatus de conservación

Especie no amenazada en España. Para las poblaciones de las Islas Atlánticas gallegas, se ha propuesto asignar las categorías de "En Peligro Crítico de Extinción (CR B1+2abc)" para las poblaciones de Cíes; "En Peligro de Extinción (EN B1+2bc)" para las de Ons, y "Vulnerable (VU B1+2bcd)" para la de Sálvora.

Distribución

Se distribuye por la mitad occidental de la Península Ibérica. Está presente en Portugal, Galicia, Asturias, la cornisa cantábrica, parte de las dos Castillas, suroeste de Madrid y Sierra del Guadarrama, Extremadura y Andalucía occidental (al norte del río Guadalquivir). Es más abundante en altitudes bajas (hasta 1000 metros), aunque excepcionalmente puede alcanzar cotas cercanas a los 2000 metros.



Habitat

Prefiere zonas abiertas y con abundante vegetación herbácea. Los medios acuáticos que emplea para la reproducción suelen ser de escasa entidad y en muchas ocasiones temporales, como pequeños charcos de lluvia, aliviaderos de fuentes y zonas remansadas de arroyos. Toleran bien concentraciones altas de sales, lo que les permite ocupar también charcas en dunas costeras.

Ecología trófica

Son muy voraces y se alimentan básicamente de arácnidos, insectos (sobre todo coleópteros, dípteros y ortópteros), moluscos y oligoquetos. Los adultos practican el canibalismo sobre ejemplares juveniles con cierta frecuencia. Las larvas se alimentan fundamentalmente de algas del fitoplancton y detritus.

Biología de la reproducción

El periodo de reproducción es muy extenso. Los machos en celo presentan callosidades nupciales en los dos primeros dedos de las extremidades anteriores y ocasionalmente en la región gular. El amplexus tiene lugar en el agua y es de tipo inguinal. Las puestas están formadas por varios cientos de huevos que son depositados individualmente en el fondo de las charcas. Tras la eclosión el desarrollo es muy rápido (entre tres semanas y dos meses).

Interacciones entre especies

En ocasiones comparte lugares de puesta con *Bufo bufo* y *Bufo calamita*; sin embargo, no suele coexistir junto con *Pelobates cultripipes* y *Rana perezi*, especies que tienden a desplazar a *D. galganoi*. Es depredado por numerosas especies de aves, pero también por reptiles (culebras de agua) y mamíferos (nutrias, ginetas y visones).

Patrón social y comportamiento

Los hábitos de los adultos son fundamentalmente nocturnos, si bien durante el periodo de reproducción resulta frecuente observarlos de día. Los juveniles tienen costumbres más diurnas, y permanecen en los alrededores de los puntos de agua que habitan, generalmente camuflados entre la vegetación de las orillas.

Origen y evolución

Capula y Corti (1993) y Zangari et al. (2006) consideran a *D. galganoi* y *D. jeanneae* como subespecies (*D. g. galganoi* y *D. g. jeanneae*). García-París y Jockusch (1999) y Martínez-Solano (2004) han confirmado el estatus específico de ambos taxones. Según García-París y Jockusch (1999) la separación entre ambos linajes tuvo lugar antes del límite Mio-Plioceno.¹

Descripción del adulto



Individuo con manchas irregulares en el dorso. © Iñigo Martínez-Solano.

Martínez-Solano, I. (2003). Sapillo pintojo ibérico – *Discoglossus galganoi*. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Carrascal, L. M., Salvador, A. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.
<http://www.vertebradosibericos.org/>

Cabeza aplanada, casi tan ancha como larga. El hocico es obtusamente puntiagudo y sobresale apreciablemente con respecto a la mandíbula inferior. Tímpano pequeño (diámetro inferior a 2/3 del diámetro del ojo), apenas perceptible a simple vista. Sacos vocales ausentes. Pupila redondeada o acorazonada. No presentan glándulas parotoideas. La mitad superior del iris es de color dorado, mientras que la porción inferior es más oscura. Presentan dientes maxilares y vomerianos, estos últimos situados por detrás de las coanas. La lengua es redondeada. Tres tubérculos palmares, el central de mayor tamaño que los dos laterales. Tubérculos subarticulares ausentes. Un tubérculo metatarsiano interno. Palmeaduras entre los dedos de las extremidades posteriores muy reducidas (aproximadamente hasta la mitad de la longitud de los dedos en los machos), casi ausentes en las hembras y subadultos. Las patas posteriores son relativamente cortas. Al extender las extremidades posteriores hacia delante la articulación tibio-tarsal no sobrepasa el extremo del hocico (Ladeiro, 1956; García-París, 1985; Barbadillo, 1987; Galán y Fernández Arias, 1993).

La piel es lisa, o con pequeñas granulaciones. Existen dos pliegues cutáneos glandulares que se extienden de manera más o menos interrumpida desde la parte posterior de los ojos hasta la región inguinal. En la época de celo el macho presenta el contorno ventral de la mandíbula inferior cubierto de papilas negras que en ocasiones se extienden también por el vientre y los miembros anteriores (especialmente en la cara interna de los dos primeros dedos) (Ladeiro, 1956; García-París, 1985; Barbadillo, 1987; Galán y Fernández Arias, 1993; Salvador y García-París, 2001; García-París et al., 2004).

La coloración es muy variable: pueden presentar tonalidades pardas, pardo-amarillentas, rosáceas, verdosas o casi negras. En la mayor parte de los ejemplares está presente una mancha oscura triangular o con forma de "X" o "H" situada por detrás de los ojos. El diseño es también muy variable. Generalmente está formado por manchas de color crema, pardo oscuro o negro con un bordeado más claro, distribuidas de manera más o menos irregular por el dorso del animal. También es frecuente encontrar ejemplares con diseños dorsales formados por tres bandas longitudinales dorsales, una central, generalmente más ancha y de color más claro, y dos laterales más estrechas. Por último, algunos ejemplares presentan coloraciones uniformes. Galán Regalado (2003) cita la existencia de individuos de coloración muy oscura en la isla de Sálvora (ver fotografía, pág. 266). En las extremidades posteriores suelen presentar bandas transversales oscuras. La piel ventral presenta granulaciones y la coloración es blanquecina o amarillenta (sobre todo en la región inguinal), o bien rosácea en la extremidades posteriores (García-París, 1985; Barbadillo, 1987; González de la Vega, 1988).

La talla oscila entre 45 y 75 mm, si bien excepcionalmente pueden alcanzar hasta 80 mm (Barbadillo, 1987; Ferrand de Almeida *et al.*, 2001; Galán Regalado, 2003). Los machos alcanzan tamaños mayores que las hembras.

Descripción de la larva

La longitud total varía generalmente entre 25 y 40 mm. El ano se sitúa en la línea media del cuerpo y se abre posteriormente. Los dentículos labiales están dispuestos en filas dobles en cada serie, presentando dos series superiores y tres inferiores. La serie superior del labio inferior está interrumpida en el medio. El espiráculo es ventral y su apertura se localiza sobre la línea media, aproximadamente en el centro del cuerpo. Cola entre tres veces y media y cuatro veces más larga que alta, con un fino reticulado poligonal y terminada en un extremo redondeado. La cresta caudal es relativamente baja. La coloración es inicialmente pardo oscura y según avanza el desarrollo tiende a ser de color marrón claro. En ocasiones algunos ejemplares presentan una banda mediodorsal clara, más patente en ejemplares próximos a la metamorfosis (García-París, 1985; Barbadillo, 1987; González de la Vega, 1988; Galán y Fernández Arias, 1993; Ferrand de Almeida *et al.*, 2001).

Variación geográfica

La coloración general de los ejemplares de *Discoglossus galganoi* es, como se ha comentado anteriormente, muy variable, si bien pueden encontrarse ejemplares con los tres tipos de diseño descritos en una misma población (Ferrand de Almeida *et al.*, 2001).

Martínez-Solano (2004) distingue tres clados, uno formado por las poblaciones situadas al norte del río Duero, otro formado por las poblaciones situadas entre los ríos Duero y Tajo, y otro formado por las poblaciones situadas al sur del río Tajo.

Otras contribuciones: 1: Alfredo Salvador. 29-11-2006

Habitat

Se encuentra en una gran variedad de hábitats. En cuanto al tipo de substrato geológico, casi siempre está presente sobre substratos silíceos o metamórficos. Ocupa zonas abiertas, como praderas y zonas aclaradas en los límites de áreas boscosas (encinares, melojares, pinares), pero también suele encontrarse en riberas de ríos y arroyos, junto a choperas y fresnedas. Excepcionalmente puede aparecer también en cuevas y en minas abandonadas. Generalmente se localiza en zonas de elevada humedad, casi siempre en las inmediaciones de las masas de agua que ocupa, sobre todo en las áreas donde abunda la vegetación herbácea, en la que buscan refugio. Durante el periodo reproductor suele observarse en prados encharcados, charcas de lluvia, cunetas o arroyos (en cuyo caso suelen escoger las zonas más remansadas o de menor profundidad). En ocasiones se reproducen en aguas con cierto grado de contaminación orgánica. Toleran bien la presencia humana y a menudo se reproducen en acequias, albercas, manantiales, así como los aliviaderos de fuentes y abrevaderos localizados en el interior de núcleos urbanos. Ocasionalmente puede encontrarse también en marismas y lagunas costeras, ya que toleran bien concentraciones salinas elevadas (ver fotografía en Galán Regalado, 2003 –pág. 266-). En Sálvora se encuentran con cierta frecuencia en hábitats relativamente secos, incluidos herbazales halófilos y roquedos costeros (Galán Regalado, 2003).

Prefiere zonas de media o baja altitud, generalmente entre 300 y 900 metros de altitud, aunque existen citas desde el nivel del mar en Huelva, Asturias y Galicia hasta 1940 m en la provincia de Ávila (García-París, 1985; Bas, 1986; Galán y Fernández Arias, 1993; Vences, 1994; Galán, 1997a; García-París, 1997; Ferrand de Almeida *et al.*, 2001; Salvador y García-París, 2001; Martínez-Solano, 2002; Galán Regalado, 2003).

Abundancia

En general, presenta poblaciones abundantes en la mayor parte de su área de distribución, exceptuando quizás en el límite nororiental en la cordillera cantábrica. En Galicia puede alcanzar densidades de hasta 1000 individuos por hectárea (Galán, 1999). Vences (1994) cita una concentración de algo menos de 100 ejemplares en una charca de 4 metros cuadrados.

Amenazas

Especie no amenazada en España, considerada "Preocupación Menor" en el Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España (Martínez-Solano, 2002). Las principales amenazas que presenta la especie derivan de la alteración o destrucción directa de los medios acuáticos en que se desarrollan sus poblaciones, como el drenaje de praderas y herbazales húmedos e invasión de estos últimos por matorrales. Otros factores implicados son: el impacto derivado de

Martínez-Solano, I. (2003). Sapillo pintojo ibérico – *Discoglossus galganoi*. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Carrascal, L. M., Salvador, A. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.
<http://www.vertebradosibericos.org/>

los cultivos agrícolas extensivos, las prácticas forestales inadecuadas, la contaminación química de los medios acuáticos por fitosanitarios y fertilizantes y el vertido de escombros (Lizana y Barbadillo, 1997). Por otro lado, en muchas ocasiones se ha observado la presencia del cangrejo americano *Procambarus clarkii*, depredador de huevos y larvas de anfibios, en masas de agua temporales como las que usa la especie para reproducirse (Galán, 1997b; Martínez-Solano y Bosch, 2001). Finalmente, el impacto del atropello de ejemplares en carreteras parece constituir un factor negativo para la especie de importancia marginal, aunque algunos autores han señalado la posibilidad de que su relevancia pueda haber sido subestimada, especialmente en el caso de ejemplares recién metamorfoseados (Lizana y Barbadillo, 1997). Las poblaciones insulares gallegas de Ons y Cíes se encuentran en franco declive (Galán Regalado, 2003).

El uso de fertilizantes agrícolas puede tener consecuencias negativas sobre el desarrollo larvario. Se ha comprobado incremento de la tasa de anomalías morfológicas, mayor mortalidad larvaria y menor talla cuando se expuso a los embriones a elevadas concentraciones de nitrato de amonio (Ortiz et al., 2004).¹

Se ha observado experimentalmente que la sensibilidad al nitrato de amonio varía en función del estadio de desarrollo larvario, sufriendo efectos mayores los individuos más jóvenes (Ortiz-Santaliestra et al., 2006).²

Otras contribuciones: 1: Alfredo Salvador. 14-12-2004; 2: Alfredo Salvador. 29-11-2006

Distribución

Su área de distribución mundial comprende Portugal y la mitad occidental de la España peninsular (Boscá, 1877, 1880; Salvador, 1974, 1985; García-París, 1985; Capula *et al.*, 1985; Busack, 1986; Barbadillo, 1987; Rey *et al.*, 1994; García-París, 1997; García-París y Jockusch, 1999; Salvador y García-París, 2001; Martínez-Solano, 2002a, 2002b).

En Portugal ocupa prácticamente todo el territorio, si bien en forma de núcleos más o menos fragmentados (Sequeira, 1886; Ferreira y Seabra, 1913; Oliveira, 1931; Crespo, 1975; Malkmus, 1981, 1982a, b; Pfau, 1988; Crespo y Oliveira, 1989; Ferrand de Almeida *et al.*, 2001; Malkmus, 2004).

En España, está presente en toda Galicia, con poblaciones insulares en Sálvora, Ons, Cortegada, Arousa y Cíes (López Seoane, 1877; Castroviejo, 1974; Bas, 1983, 1986; Maneiro, 1983; Galán, 1987; Cifuentes y García, 1993; Galán y Fernández Arias, 1993; Balado *et al.*, 1995; Pino *et al.*, 1998; Galán, 1999; Galán Regalado, 2003). En Cíes no se ha confirmado su presencia entre los años 1999-2003, aunque existen datos concretos de su presencia en las islas de San Martiño y Faro en la década de los 90 (Galán Regalado, 2003). Se extiende hacia el este por toda Asturias y la mayor parte de la cornisa cantábrica, si bien su presencia es cada vez más puntual en sentido oeste-este, sin llegar al País Vasco (Meijide, 1985; Pérez de Ana, 1996; Martínez-Solano *et al.*, 2001). Está presente también en el norte y oeste de Castilla y León (provincias de León, Zamora y Salamanca) (Palaus, 1974; Rey y Martínez-Rica, 1977; Vericad, 1979; San Segundo y Ferreiro, 1987; Lizana *et al.*, 1991; Morales *et al.*, 1997; Pollo *et al.*, 1998).

La asignación de las poblaciones de *Discoglossus* de las provincias de Segovia, Palencia y Valladolid a *D. galganoi* es tentativa y precisa confirmación mediante análisis moleculares. Más al sur, existen poblaciones en Ávila, Extremadura, suroeste de Madrid y Sierra del Guadarrama, la mayor parte de Toledo (exceptuando las poblaciones localizadas en el extremo este de la provincia (Montes de Toledo) y Ciudad Real (García-París y Martín, 1987; García-París *et al.*, 1989a; Palomo, 1993; Da Silva Rubio, 1994; Lizana *et al.*, 1994, 1995). En Andalucía occidental ocupa la provincia de Huelva y la parte de las provincias de Sevilla y Córdoba situada al norte de la cuenca del Río Guadalquivir, que sirve de límite natural de distribución entre las dos especies a lo largo de casi todo su recorrido (Mellado, 1974; Collado

Martínez-Solano, I. (2003). Sapillo pintojo ibérico – *Discoglossus galganoi*. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Carrascal, L. M., Salvador, A. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.
<http://www.vertebradosibericos.org/>

et al., 1976; Díaz Paniagua, 1983, 1985, 1988; González de la Vega, 1988). Por el momento no se ha confirmado la presencia de *D. galganoi* en la provincia de Jaén mediante datos moleculares.

Se ha estudiado la distribución de *D. jeanneae* y *D. galganoi* mediante el análisis de datos moleculares y variables ambientales en 54 poblaciones. *D. galganoi* se asocia con longitudes occidentales, grandes cuencas fluviales, sustratos semipermeables (sobre todo silíceos) y arenosos mientras que *D. jeanneae* se asocia con longitudes orientales, áreas montañosas, fuertes inundaciones y suelos impermeables (sobre todo arcillosos) o básicos (Real *et al.*, 2005).

Otras contribuciones: 1: Alfredo Salvador. 23-12-2005

Ecología trófica

Los adultos y juveniles se alimentan fundamentalmente en el medio terrestre, en las zonas húmedas cercanas a los medios acuáticos donde habitan. Consumen una amplia variedad de invertebrados (Tabla 1): arácnidos, moluscos (pequeños caracoles y babosas), oligoquetos e insectos: dípteros, coleópteros, efemerópteros, dermápteros, hemípteros, ortópteros, lepidópteros e himenópteros de pequeño tamaño (García-París, 1985; Lizana *et al.*, 1986; Barbadillo, 1987; González de la Vega, 1988; Vázquez Patiño, 1999; Galán Regalado, 2003). En general, no seleccionan especialmente sus presas y consumen prácticamente cualquier animal del tamaño adecuado que se mueva en sus proximidades. Entre las presas rechazadas se encuentran muchos tenebriónidos, diplópodos y algunos crisomélidos (García-París, 1985). Los juveniles capturan presas de menor tamaño que los adultos y consumen también colémbolos y ácaros (Lizana *et al.*, 1986). Ocasionalmente los adultos practican el canibalismo con los juveniles de su propia especie (García-París, 1985; Barbadillo, 1987; Galán y Fernández Arias, 1993).

Las larvas se alimentan de algas del fitoplancton, materia animal o vegetal en descomposición y, en menor medida, de pequeños invertebrados acuáticos (Díaz-Paniagua, 1985; González de la Vega, 1988; Galán y Fernández Arias, 1993).

Tabla 1. Composición taxonómica de la dieta de 43 ejemplares de *Discoglossus galganoi* en la localidad de Villasrubias (Salamanca) (Lizana *et al.*, 1986).

Tipo de presa	%
Collembola	1,36
Ephemeroptera	0,27
Orthoptera	0,82
Lepidoptera	1,09
Dermaptera	0,54
Blattoidea	1,36
Homoptera	7,39
Heteroptera	0,54
Coleoptera	18,9
Diptera	24,1

Martínez-Solano, I. (2003). Sapillo pintojo ibérico – *Discoglossus galganoi*. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Carrascal, L. M., Salvador, A. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.
<http://www.vertebradosibericos.org/>

Hymenoptera	11,78
Formicidae	16,98
Araneae	7,39
Opiliona	1,64
Acari	1,36
Isopoda	0,27
Miriapoda	2,19
Hexapoda indet.	0,54
Larvas	0,82
Annelida	0,54
Total presas	365



Macho con papilas negras en garganta y miembros anteriores. © Iñigo Martínez-Solano.

Reproducción

Suele reproducirse en masas de agua de pequeña extensión y escasa profundidad, algunas veces con algo de corriente y bien oxigenadas, aunque también se reproduce en aguas estancadas y con cierto grado de contaminación. Comparte lugares de puesta con *Bufo bufo* y *B. calamita*, pero con otras especies (*Pelobates cultripes*, *Rana perezi*) parece existir cierta competencia, favorable a estas últimas, que tienden a desplazar a *Discoglossus* (García-París, 1985; Barbadillo, 1987).

El periodo de celo es bastante extenso y comprende los meses de octubre a abril en Huelva (González de la Vega, 1988) y de diciembre a julio en Galicia (Galán y Fernández Arias, 1993). En las Islas Atlánticas el máximo número de puestas se produce entre febrero y mayo (Galán Regalado, 2003). En Doñana el periodo larvario abarca desde otoño hasta verano (Díaz-Paniagua, 1988). El canto de los machos se emite a muy baja intensidad y dura entre 400 y 1000 ms (Glaw y Vences, 1991). Las primeras puestas se producen en febrero en Madrid y en marzo o abril en Burgos (Barbadillo, 1987). Vences (1994) cita dos periodos reproductores en dos poblaciones gallegas: uno a finales de febrero y otro en mayo-junio. El amplexo es inguinal y de corta duración (menos de 2 minutos). Una misma hembra suele aparearse con varios machos. El número de huevos por puesta oscila entre 326 y 687, aunque una misma hembra, en puestas sucesivas, puede depositar hasta 1500 huevos (García-París, 1985; González de la Vega, 1988). Galán Regalado (2003) cita entre 451-1.520 huevos en los oviductos de 8 hembras grávidas de la isla de Sálvora. El tamaño de la puesta está correlacionado positivamente con el de la hembra. Los huevos son fecundados por los machos a medida que la hembra los va expulsando. Debido al gran tamaño de los espermatozoides y a su escasa

Martínez-Solano, I. (2003). Sapillo pintojo ibérico – *Discoglossus galganoi*. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Carrascal, L. M., Salvador, A. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.
<http://www.vertebradosibericos.org/>

movilidad, hasta un 60% de los huevos puede quedar sin fecundar (García-París, 1985). Las larvas eclosionan a los 2-9 días y completan su desarrollo en 20-60 días (García-París, 1985; Galán y Fernández Arias, 1993).

Se ha examinado experimentalmente el efecto que tienen la temperatura y la calidad de la dieta sobre las tasas de crecimiento, periodo larvario y talla metamórfica de las larvas, observándose que el peso varió inversamente con la temperatura y que el efecto de la dieta dependía de la temperatura. Las larvas alimentadas con dieta carnívora alcanzaron una mayor talla que las alimentadas con una dieta herbívora si eran mantenidas a 17°C pero no a 12°C o a 22°C. La duración del periodo larvario solo varió con la temperatura, no con la dieta. También se observó que la interacción entre calidad del alimento y temperatura afectaba a la talla metamórfica: en dietas basadas en plantas o en animales la talla metamórfica varió inversamente con la temperatura. Sin embargo, bajo dieta carnívora hubo mayores metamórficos a 17°C y a 22°C pero no a 12°C (Alvarez y Nicieza, 2002a).¹

La influencia de la variabilidad ambiental del hábitat sobre el desarrollo de las larvas puede extenderse a caracteres de su fase terrestre como el crecimiento y supervivencia. Los individuos experimentalmente mantenidos a temperatura elevada (22°C) durante su fase larvaria mostraron una capacidad reducida de salto, especialmente cuando fueron alimentados con una dieta vegetal. Los individuos mantenidos a baja temperatura (12°C) mostraron la menor capacidad de salto y los mantenidos a temperatura intermedia (17°C) con dieta herbívora la más elevada capacidad de salto. En lo que se refiere a las reservas energéticas, las larvas mantenidas a baja temperatura acumularon mayores cantidades de reservas que las mantenidas a otras temperaturas más altas (Alvarez y Nicieza, 2002b).²

Se ha observado experimentalmente que los juveniles que emergen de ambientes con depredadores tienen las patas más cortas y cuerpos más largos que los que emergen de ambientes sin depredadores, pero estas diferencias no afectan a la capacidad de saltar (Nicieza et al., 2006).³

Demografía

No existen datos acerca de la estructura de edad de sus poblaciones. En una muestra de 54 ejemplares, la edad osciló entre 1 y 8 años, con una media de algo más de 4 años (Esteban *et al.*, 1998). Según Galán y Fernández Arias (1993), el sex-ratio tras la metamorfosis es 1:1, si bien tras la madurez sexual la proporción es favorable a los machos (hasta 7:3). García-París *et al.* (1989b) citan también una mayor proporción de machos en algunas poblaciones madrileñas. Vences (1994) estima entre 72-93 y 109-204 machos adultos en dos poblaciones de A Coruña durante el periodo de reproducción.

Otras contribuciones: 1: Alfredo Salvador. 10-02-2004. 2: Alfredo Salvador. 10-02-2004. 3: Alfredo Salvador. 29-11-2006

Estrategias antidepredatorias

Los adultos huyen escondiéndose entre la vegetación y, cuando son capturados, pueden emitir por la piel una secreción blanquecina tóxica.

Depredadores

Entre los depredadores de adultos y juveniles de *Discoglossus* se han citado culebras de agua (*Natrix natrix* y *Natrix maura*, Castroviejo, 1974; Galán, 1988); aves (*Buteo buteo*, *Lanius collurio*, *Tyto alba*, *Ciconia ciconia*, *Ciconia nigra*, *Athene noctua*, *Strix aluco*, *Ardea* y *Ardeola*,

Martínez-Solano, I. (2003). Sapillo pintojo ibérico – *Discoglossus galganoi*. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Carrascal, L. M., Salvador, A. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.
<http://www.vertebradosibericos.org/>

Sanchiz y Pérez, 1974; Veiga, 1980; Brunet-Leconte y Delibes, 1984; Bustamante-Díaz, 1985; Barbadillo, 1987; Martín y López, 1990; Rey *et al.*, 1994; Hernández, 1995; Ferrand de Almeida *et al.*, 2001) y mamíferos (*Genetta genetta*, Calviño *et al.*, 1984; *Lutra lutra*, Callejo-Rey *et al.*, 1979; Adrián y Delibes, 1987; Callejo, 1988; y *Mustela vison*, Vidal Figueroa y Delibes, 1987; Galán Regalado, 2003). Las larvas son depredadas por insectos acuáticos, peces, culebras de agua y otros anfibios, como *Triturus marmoratus* (García-París, 1985; Barbadillo, 1987).

Parásitos

Se ha citado la presencia frecuente de sanguijuelas (*Batrachobdella*) en ejemplares de poblaciones madrileñas (García-París, 1985).

Actividad

Los adultos son de costumbres fundamentalmente crepusculares y nocturnas, únicamente resulta más frecuente observarlos de día durante la época de reproducción. Los juveniles son más activos durante el día. Generalmente se encuentran activos a lo largo de todo el año, si bien suelen presentar periodos de reposo en los meses más secos o de temperaturas más frías, aunque probablemente sin presentar una verdadera hibernación. En las zonas más altas el periodo de actividad puede acortarse (de febrero a noviembre en el Sistema Central). Cuando las condiciones de temperatura y humedad son desfavorables permanecen inactivos, generalmente ocultos bajo piedras y troncos o en galerías excavadas por ellos mismos o por otros animales (García-París, 1985; Barbadillo, 1987; Salvador y García-París, 2001).

Dominio vital

No hay datos.

Bibliografía

Adrián, M. I., Delibes, M. (1987). Food habits of the otter (*Lutra lutra*) in two habitats of the Doñana National Park, SW Spain. *Journal of Zoology, London*, 212: 399-406.

Alvarez, D., Nicieza, A. G. (2002a). Effects of temperature and food quality on anuran larval growth and metamorphosis. *Functional Ecology*, 16: 640-648.

Alvarez, D., Nicieza, A. G. (2002b). Effects of induced variation in anuran larval development on postmetamorphic energy reserves and locomotion. *Oecologia*, 131: 186-195.

Balado, R., Bas, S., Galán, P. (1995): Anfibios e reptiles. En: *Atlas de Vertebrados de Galicia. Aproximación a distribución dos vertebrados terrestres de Galicia durante o quinquenio 1980-85. Tomo 1: Peixes, Anfibios, Reptiles e Mamíferos*. Consello da Cultura Galega y Sociedade Galega de Historia Natural, Agencia Gráfica, S: A, Santiago de Compostela.

Barbadillo, L. J. (1987). *La Guía de Incafo de los Anfibios y Reptiles de la Península Ibérica, Islas Baleares y Canarias*. Incafo, Madrid.

Martínez-Solano, I. (2003). Sapillo pintojo ibérico – *Discoglossus galganoi*. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Carrascal, L. M., Salvador, A. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.
<http://www.vertebradosibericos.org/>

- Bas, S. (ed.) (1983). *Atlas provisional de los vertebrados terrestres de Galicia. Años 1970-1979. Parte I. Anfibios y reptiles*. Monografías, Universidad de Santiago de Compostela, 73: 1-54.
- Bas, S. (1986). Los anfibios y reptiles de Ancares (Lugo, N.O. España). *Munibe*, 38: 89-98.
- Boscá, E. (1877). Catálogo de los reptiles y anfibios de España, Portugal é Islas Baleares. *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural*, 4(1): 39-69.
- Boscá, E. (1880). Catalogue des reptiles et amphibiens de la Peninsule Ibérique et des Iles Baléares. *Bull. Soc. Zool. Fr.*, 5: 240-287.
- Brunet-Leconte, P., Delibes, M. (1984). Alimentación de la lechuza común *Tyto alba* en la Cuenca del Duero, España. *Doñana, Acta Vertebrata*, 11 (2): 213-229.
- Busack, S. D. (1986). Biochemical and morphological differentiation in Spanish and Moroccan population of *Discoglossus* and the description of a new species from Southern Spain (Amphibia, Anura, Discoglossidae). *Ann. Carnegie Museum*, 55: 41-61.
- Bustamante-Díaz, J. (1985). Alimentación del ratonero común (*Buteo buteo*, L. 1758) en el norte de España. *Doñana, Acta Vertebrata*, 12: 51-62.
- Callejo, A. (1988). Le choix des proies par la loutre (*Lutra lutra*) dans le nord-ouest de l'Espagne, en rapport avec les facteurs de l'environnement. *Mammalia*, 52: 11-20.
- Callejo-Rey, A., Guitián-Rivera, J., Bas-López, S., Sánchez-Canals, J. L., de Castro-Lorenzo, A. (1979). Primeros datos sobre la dieta de la nutria, *Lutra lutra* (L.), en aguas continentales de Galicia. *Doñana, Acta Vertebrata*, 6: 191-202.
- Calviño, F., de Castro, A., Canals, J. L. S., Guitián, J., Bas, S. (1984). Régimen alimenticio de la gineta *Genetta genetta* L. en Galicia, noroeste de la Península Ibérica. *Boletín de la Estación Central de Ecología*, 13: 29-41.
- Capula, M., Nascetti, G., Lanza, B., Bullini, L., Crespo, E.G. (1985). Morphological and genetic differentiation between the iberian and the other west mediterranean *Discoglossus* species (Amphibia Salientia Discoglossidae). *Monitore Zoologico Italiano* (N. S.), 19: 69-90.
- Capula, M., Corti, M. (1993). Morphometric variation and divergence in the West Mediterranean *Discoglossus* (Amphibia: Discoglossidae). *Journal of Zoology (London)*, 231: 141-156.
- Castroviejo, J. (1974). *Natrix natrix* comiendo *Discoglossus pictus*. *Doñana, Acta Vertebrata*, 1(1): 58.
- Cifuentes, A., García, B. (1993). Nuevas cuadrículas para anfibios y reptiles de la provincia de Pontevedra. *Boletín de la Asociación Herpetológica Española*, 4: 2-4.
- Collado, E., Calderón, J., Pérez, M. (1976). Datos sobre la fauna de anfibios del Bajo Guadalquivir. *Doñana, Acta Vertebrata*, 3 (1): 5-17.
- Crespo, E. G. (1975). Aditamento aos Catálogos dos Répteis e Anfíbios de Portugal continental das Coleções do Museu Bocage. *Arquivos do Museu Bocage*, 2º Sér. 5(3): 479-496.
- Crespo, E. G., Oliveira, M. E. (1989). *Atlas da Distribucao dos Anfíbios e Répteis de Portugal Continental*. Servicio Nacional de Parques Reservas e Conservacao da Naturaleza, Lisboa.

Da Silva Rubio, E. (1994). Contribución al Atlas herpetológico de la provincia de Badajoz I: Anfibios. *Revista Española de Herpetología*, 8: 87-94.

Díaz-Paniagua, C. (1983). Influencia de las características del medio acuático sobre las poblaciones de larvas de anfibios en la Reserva Biológica de Doñana (Huelva, España). *Doñana, Acta Vertebrata*, 10(1): 41-53.

Díaz-Paniagua, C. (1985). Larval diets related to morphological characters of five anuran species in the Biological Reserve of Doñana (Huelva, Spain). *Amphibia-Reptilia*, 6: 307-322.

Díaz-Paniagua, C. (1988). Temporal segregation in larval amphibian communities in temporary ponds at a locality in SW Spain. *Amphibia-Reptilia*, 9: 15-26.

Esteban, M., Castanet, J., Sanchiz, B. (1998). Inferring age and growth from remains of fossil and predated Recent anurans: a test case using skeletochronology. *Canadian Journal of Zoology*, 76: 1689-1695.

Ferrand de Almeida, N., Ferrand de Almeida, P., Gonçalves, H., Sequeira, F., Teixeira, J., Ferrand de Almeida, F. (2001). *Anfibios e Répteis de Portugal*. Fapas, Porto.

Ferreira, J. de Bettencourt, Seabra, A. F. (1913). Catalogue Systématique des Vertébrés du Portugal. III - IV. Reptiles et amphibiens. *Bull. Soc. Port. Sci. Nat.*, 6(3): 97-128.

Galán, P. (1987). Notas preliminares sobre la herpetofauna de las islas Cíes y Ons. *Mustela*, 3: 64-69.

Galán, P. (1988). Segregación ecológica en una comunidad de ofidios. *Doñana, Acta Vertebrata*, 15: 59-78.

Galán, P. (1997a). Colonization of spoil benches of an opencast lignite mine in northwest Spain by amphibians and reptiles. *Biological Conservation*, 79: 187-195.

Galán, P. (1997b). Declive de poblaciones de anfibios en dos embalses de La Coruña (Noroeste de España) por introducción de especies exóticas. *Boletín de la Asociación Herpetológica Española*, 8: 38-40.

Galán, P. (1999). *Conservación de la Herpetofauna Gallega*. Universidade da Coruña, A Coruña.

Galán Regalado, P. (2003). *Anfibios y Reptiles del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia*. *Faunística, Biología y Conservación*. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, España.

Galán, P., Fernández Arias, G. (1993). Anfibios e Réptiles de Galicia. Xerais, Lugo, España.

García-París, M. (1985). Los anfibios de España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.

García-París, M. (1997). *Discoglossus galganoi* Capula, Nascetti, Lanza, Bullini, Crespo, 1985. *Discoglossus jeanneae* Busack, 1986. Pp. 134-136. En: Pleguezuelos J. M. (Ed.). *Distribución y Biogeografía de los anfibios y reptiles en España y Portugal*. Universidad de Granada - Asociación Herpetológica Española, Granada.

García-París, M., Martín, C. (1987). Amphibians of the Sierra del Guadarrama (1800-2400 m altitude). *Proc. Fourth Ord. Gen. Meet. S.E.H., Nijmegen*. 135-138.

Martínez-Solano, I. (2003). Sapillo pintojo ibérico – *Discoglossus galganoi*. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Carrascal, L. M., Salvador, A. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.
<http://www.vertebradosibericos.org/>

- García-París, M., Martín, C., Dorda, J., Esteban, M. (1989). Atlas provisional de los anfibios y reptiles de Madrid. *Revista Española de Herpetología*, 3 (2): 237-257.
- García-París, M., Martín, C., Dorda, J., Esteban, M. (1989b). *Los anfibios y reptiles de Madrid*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.
- García-París, M., Jockusch, E. L. (1999). A mitochondrial DNA perspective on the evolution of Iberian *Discoglossus* (Amphibia: Anura). *J. Zool (Lon.)*, 248: 209-218.
- García-París, M., Montori, A., Herrero, P. (2004). *Amphibia. Lissamphibia*. En: Ramos Sánchez, M. A., et al. (Eds.). *Fauna Iberica*. Vol. 24. Museo nacional de Ciencias Naturales, Madrid.
- Glaw, F., Vences, M. (1991). Bioacoustic differentiation in Painted frogs (*Discoglossus*). *Amphibia-Reptilia*, 12: 385-394.
- González de la Vega, J. P. (1988). *Anfibios y Reptiles de la Provincia de Huelva*. Ertisa, Huelva.
- Hernández, A. (1995). Depredación sobre anfibios, reptiles y aves por tres especies de alcaudones *Lanius spp.* en el noroeste de la Península Ibérica. *Ecología*, 9: 409-415.
- Ladeiro, J. M. (1956). Anfibios de Portugal (Notas para a sua classificação). *Memórias e estudos do Museu Zoológico da Universidade de Coimbra*, 243: 1-36.
- Lizana, M., Ciudad M. J., Pérez-Mellado, V. (1986). Uso de los recursos tróficos en una comunidad ibérica de anfibios. *Revista Española de Herpetología*, 1: 207-271.
- Lizana, M., Ciudad Pizarro, M. J.; Pérez Mellado, V. (1989). Actividad, reproducción y uso del espacio en una comunidad de anfibios. *Treb. Soc. Cat. Ictio. Herp.*, 2: 92-127.
- Lizana, M., Ciudad, M. J., Guerrero, F., Pérez-Mellado, V., Martín-Sánchez, R. (1991). Nuevos datos sobre la distribución de los anfibios y reptiles en el Macizo Central de la Sierra de Gredos. *Revista Española de Herpetología*, 6: 61-80.
- Lizana, M., Morales, J. J., López González, F. J., Martín Sánchez, R., del Arco Díaz, C. (1994). Distribución y protección de los anfibios y reptiles de las Sierras de Guadarrama, Somosierra y Ayllón. En: *Premios de V Concurso sobre el Medio Ambiente*, Caja Segovia.
- Lizana, M., del Arco, C., Morales, J. J., Bosch, J., Cejudo, D., López González, F. J., Gutiérrez, J., Martín Sánchez, R. (1995). Atlas provisional de la herpetofauna en el Sistema Central segoviano. *Revista Española de Herpetología*, 9: 113-132.
- Lizana, M., Barbadillo, L. J. (1997). Legislación, protección y estado de conservación de los anfibios y reptiles españoles. En: *Distribución y Biogeografía de los Anfibios y Reptiles en España y Portugal*. Pleguezuelos, J. M. Universidad de Granada – Asociación Herpetológica Española, Granada.
- López Seoane, V. (1877). Reptiles y Anfibios de Galicia. *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural*, 6: 349-358.
- Malkmus, R. (1981). Os anfibios e répteis nas Serras de Portugal. *Arquivos do Museu Bocage*, Sér.B, 1(9): 97-122.
- Malkmus, R. (1982a). Beitrag zur Verbreitung der Amphibien und Reptilien in Portugal. *Salamandra*, 18(3/4): 218-299.

- Malkmus, R. (1982b). Die Bedeutung der Brunnen für den Amphibien-Bestand Portugals. *Salamandra*, 18(3/4): 205-217.
- Malkmus, R. (2004). *Amphibians and Reptiles of Portugal, Madeira and the Azores-Archipelago*. A. R. G. Gantner Verlag K. G., Ruggell.
- Maneiro, J. C. (1983). *Vertebrados de la ría de Arosa: faunística, biogeografía de islas y estudio de las poblaciones de Crocidura russula*. Tesina de licenciatura, Universidad de Santiago de Compostela.
- Martín, J., López, P. (1990). Amphibians and reptiles as prey of birds in southwestern Europe. *Smithsonian Herpetological Information Service*, 82: 1-43.
- Martínez-Solano, I. (2002a). *Discoglossus galganoi* Capula, Nascetti, Lanza, Bullini, Crespo, 1985. Sapillo pintojo ibérico. Pp. 85-87. En: Pleguezuelos, J. M.; Márquez, R.; Lizana, M. (Eds.). *Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Asociación Herpetológica Española, Madrid.
- Martínez-Solano, I. (2002b). *Discoglossus galganoi* Capula, Nascetti, Lanza, Bullini, Crespo, 1985. Sapillo pintojo ibérico. Pp. 85-87. En: Pleguezuelos, J. M.; Márquez, R.; Lizana, M. (Eds.). *Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España*. Segunda impresión. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Asociación Herpetológica Española, Madrid.
- Martínez-Solano, I. (2004). Phylogeography of Iberian *Discoglossus* (Anura: Discoglossidae). *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, 42 (4) : 298-305.
- Martínez-Solano, I., Bosch, J. (2001). Peligro para los anfibios de las canteras madrileñas de Alpedrete. *Quercus*, 188: 54-55.
- Martínez-Solano, I., Nieto, M., Sánchez, I. M., Marugán, J. (2001). Nuevas citas de anfibios y reptiles en Asturias. *Boletín de la Asociación Herpetológica Española*, 12 (2): 80-81.
- Meijide, M. W. (1985). Localidades nuevas o poco conocidas de anfibios y reptiles de la España continental. *Doñana, Acta Vertebrata*, 12 (2): 318-323.
- Mellado, J. (1974). *Natrix maura* alimentándose de notonéctidos. *Doñana, Acta Vertebrata*, 1(1): 56-57.
- Morales, J. J., Lizana, M., Martín-Sánchez, R., López-González, J. (1997). Nuevos datos sobre la distribución de anfibios en la provincia de Salamanca. *Boletín de la Asociación Herpetológica Española*, 8: 12-14.
- Nicieza, A. G., Alvarez, D., Atienza, E. M. S. (2006). Delayed effects of larval predation risk and food quality on anuran juvenile performance. *Journal of Evolutionary Biology*, 19 (4): 1092-1103.
- Oliveira, M. P. (1931). *Reptis e anfíbios da Península Ibérica e especialmente de Portugal*. Universidade de Coimbra.
- Ortiz, M. E., Marco, A., Saiz, N., Lizana, M. (2004). Impact of ammonium nitrate on growth and survival of six European amphibians. *Archives of Environmental Contamination and Toxicology*, 47 (2): 234-239.

- Ortiz-Santaliestra, M. E., Marco, A., Fernandez, M. J., Lizana, M. (2006). Influence of developmental stage on sensitivity to ammonium nitrate of aquatic stages of amphibians. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 25 (1): 105-111.
- Palau, J. (1974). Nuevos datos sobre la distribución geográfica de los anfibios y reptiles ibéricos. *Doñana, Acta Vertebrata*, 1 (1): 19-27.
- Palomo, J. A. (1993). Atlas provisional de los anfibios y reptiles de Extremadura. *Aegyptus*, 11: 7-20.
- Pérez de Ana, J. M. (1996). Observaciones de anfibios y reptiles en el norte de Burgos y el este de Cantabria. *Boletín de la Asociación Herpetológica Española*, 7: 13.
- Pfau, J. (1988). Beitrag zur verbreitung der herpetofauna in der Niederalgarve (Portugal). *Salamandra*, 24: 258-275.
- Pino, J. J., López, C., Carballo, C., Pino, R. (1998). Parque Natural de las Islas Cíes. En: Santos, X.; Carretero, M. A.; Llorente, G. A.; Montori, A. (Eds.). *Inventario de las áreas importantes para los anfibios y reptiles de España*. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid.
- Pollo, C. J., Velasco-Marcos, J. C., González-Sánchez, N. (1998). La fauna herpetológica del espacio natural de los Arribes del Duero. *Boletín de la Asociación Herpetológica Española*, 9: 4-10.
- Real, R., Barbosa, A. M., Martínez-Solano, I., García-París, M. (2005). Distinguishing the distributions of two cryptic frogs (Anura: Discoglossidae) using molecular data and environmental modeling. *Canadian Journal of Zoology*, 83 (4): 536-545.
- Rey, J. M., Martínez-Rica, J. P. (1977). Dos estudios sobre la fauna de Gredos. *Boletín informativo Medio Ambiente*, 3: 33-53.
- Rey, J. M., Esteban, M., Sanchiz, B. (1994). Registros corológicos de anfibios españoles fundamentados en egagrópilas de lechuga común. *Boletín de la Asociación Herpetológica Española*, 5: 4-8.
- Rodríguez Jiménez, A. J. (1988). Fenología de una comunidad de anfibios asociada a cursos fluviales temporales. *Doñana, Acta Vertebrata*, 15(1): 29-43.
- Salvador, A. (1974). *Guía de los anfibios y reptiles españoles*. ICONA, Madrid.
- Salvador, A. (1985). *Guía de campo de los anfibios y reptiles de la Península Ibérica, Islas Baleares y Canarias*. Ed. del autor, León.
- Salvador, A., García-París, M. (2001). *Anfibios Españoles. Identificación, Historia Natural y Distribución*. Esfagnos, Talavera de la Reina.
- Sanchiz, B., Pérez, J. P. (1974). Frecuencia de anomalías óseas en la población de *Discoglossus pictus* (Anura, Discoglossidae) de Campos (Asturias). *Boletín de la Estación Central de Ecología*, 6: 69-77.
- San Segundo, C., Ferreiro, E. (1987). Estudio y catalogación de los anfibios en la Sierra de Gredos. *Cuadernos de Estudios Abulenses*, 7: 67-92.
- Sequeira, E. (1886). Distribuição geographica dos Reptis em Portugal. *Bol. Soc. Geogr. Lisboa*, 6ª sér., 5: 261-274.
- Martínez-Solano, I. (2003). Sapillo pintojo ibérico – *Discoglossus galganoi*. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Carrascal, L. M., Salvador, A. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.
<http://www.vertebradosibericos.org/>

Vázquez Patiño, V. A. (1999). *Ecología trófica de una población suburbana de Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi Capula et al., 1985) en el noroeste de la Península Ibérica*. Tesina de Licenciatura, Universidad de A Coruña.

Veiga, J. P. (1978). Alimentación y relaciones tróficas entre la lechuza común (*Tyto alba*) y el buho chico (*Asio otus*) en la Sierra de Guadarrama (España). *Ardeola*, 25: 113-142.

Vences, M. (1994). Erste untersuchungen über die fortpflanzungsbiologie des Ibersichen Scheibenzünglers *Discoglossus galganoi* (Amphibia: Anura: Discoglossidae). *Acta Biologica Benrodis*, 6: 89-98.

Vericad, J. R. (1979). Estudio faunístico de la dehesa: anfibios y peces. En: *Estudio integrado y multidisciplinario de la dehesa salmantina. 1. Estudio fisiográfico descriptivo. (3)*.

Vidal Figueroa, T., Delibes, M. (1987). Primeros datos sobre el visón americano (*Mustela vison*) en el suroeste de Galicia y noroeste de Portugal. *Ecología*, 1: 145-152.

Zangari, F., Cimmaruta, R., Nascetti, G. (2006). Genetic relationships of the western Mediterranean painted frogs based on allozymes and mitochondrial markers: evolutionary and taxonomic inferences (Amphibia, Anura, Discoglossidae). *Biological Journal of the Linnean Society*, 87 (4): 515-536.

Revisiones: 10-02-2004; 6-07-2004; 14-12-2004; 23-12-2005; 29-11-2006