

# Sigilosos habitantes de los pinares de Aldeamayor al natural

## Descubre los tesoros naturales de Aldeamayor de San Martín

Cuando del alfoz de Valladolid se trata, lo primero que viene a la cabeza es su enorme crecimiento urbanístico. Sin embargo, el Término Municipal de Aldeamayor de San Martín, de 5.336 ha. de superficie, posee muchas características y bienes tanto o más relevantes que éste: en él coexisten hasta cuatro Montes catalogados de Utilidad Pública por su especial valor ecológico (730ha; 13'70% del T.M.); y, por si fuera poco, otras 1.185 hectáreas (22'20% del T.M.) están propuestas para su declaración como L.I.C. (Lugar de Interés Comunitario) dentro de la Red Natura 2000, con la denominación de "Salgueros de Aldeamayor", en atención

a su singularidad como humedales, sólo comparables en cuanto a sus características a las Lagunas de Villafañila. Tal es el potencial de "Aldeamayor al natural", que más de un tercio (1.915 ha) del T.M. está estrictamente protegido.

Sin ir más lejos, en un radio de menos de dos kilómetros del lugar donde nos encontramos, la Ermita de Nuestra Señora de Compasco, inmersa en plena ruta de senderismo "Donde los pinos sueñan", podemos caminar sobre dos de los citados Montes de UP (Arenas, incendiado en junio de 2004; y Marinas de Arriba), los parajes singulares de El Manadero, el centenario Pino Carranza,

el Corral Viejo de los Toros de Portillo, el galardonado Espacio Natural de la Alenera de Compasco, Casablanca o las vistosas laderas de Juarras.

Estos ecosistemas pinariegos, de indudable importancia dentro de la provincia, son hábitat propicio para una sigilosa aunque abundante fauna: lobos, zorros, tejones, jabalís, corzos, conejos, murciélagos, ardillas, erizos, ratones y una variada representación de aves (águilas calzadas, ratoneros, búhos, mochuelos, autillos, cernícalos, abubillas, abejarucos, rabilargos,...) son sólo un pequeño ejemplo de cuán numerosos son los silenciosos testigos de todos nuestros pasos por el municipio.



## LOBO (Canis lupus)

MAMÍFERO.  
FAM. CÁNIDOS.  
CARNÍVORO.

Posee el aspecto de un pastor alemán (unos 130cm y 30kg), con tonalidad dorada, cabeza algo más grande y redondeada, y ojos oblicuos.

Se adapta a una amplia variedad de medios, siempre que disponga de alimento y protección frente al hombre. Viven en manadas jerarquizadas, de unos cinco individuos, con áreas de campeo de 400km<sup>2</sup> y desplazamientos diarios de hasta 20km.

Su dieta es muy diversa, aunque como en muchos otros grandes depredadores ibéricos se fundamenta en el conejo (50%); el ganado doméstico (sobre todo carroña) y ungulados silvestres la completan, no constituyendo un peligro real para el hombre.

Tras la persecución histórica a la que se vio sometido desde 1970, su población se ha recuperado notablemente al norte del Río Duero, debido a su estatus de protección y el desdoblamiento del campo; no así en el Sur de la Península, donde la caza ilegal causa estragos sobre su número.

En Aldeamayor sólo se encuentra de paso en Juarras y Compasco, llegando a causar daños en alguna ocasión en la finca de ganado de Samazo, pues habita en los cercanos montes de Tudela de Duero y Montemayor. Antiguamente en el paraje "Los Lobos" (Cañada de Tudela) se alimentaban de presas trashumantes.



## ZORRO (Vulpes vulpes)

MAMÍFERO.  
FAM. CÁNIDOS.  
OMNÍVORO.

La figura del zorro o "raposo" es inconfundible: color rojizo, hocico afilado, orejas erguidas y cola larga y poblada, horizontal al andar. El cuerpo mide 60cm (aproximadamente la mitad que el lobo) y la cola otros 40cm, para sólo 6kg de peso, pues la mayor parte de su volumen es pelo.

Ocupa cualquier tipo de hábitat, con un mínimo de refugio y alimento, siendo así el carnívoro más abundante y adaptable a la mayoría de ecosistemas españoles, aumentando día a día su población por el descenso de sus predadores naturales (lobo, águilas y buho real).

Viven en territorios bien definidos, de tamaño

inversamente proporcional al alimento disponible (generalmente unas 350ha), en parejas o grupos de un macho y tres o cuatro hembras adultas.

De actividad principalmente nocturna, se alimenta de conejos, pequeños mamíferos, carroña, basura y, en otoño, de bayas y frutos, ayudándose de su cola para realizar rápidos quiebros.

Está muy presente dentro de nuestro Término Municipal, especialmente en los parajes de las Marinas, Casablanca, Compasco y Ramón, reduciendo en aspectos indudablemente beneficiosos, como el control de roedores, y en otros negativos, como los daños sobre crías de perdices y liebres.



## TEJÓN (Meles meles)

MAMÍFERO.  
FAM. MUSTÉLIDOS.  
CARNÍVORO.

Aunque insuficientemente conocido, la apariencia del tejón o "tassugo" también es especial: cuerpo rechoncho (75cm y 13kg), cabeza blanca con dos bandas negras laterales que abarcan ojos y orejas, hocico afilado, cuerpo gris, y pecho, vientre y extremidades negras, de pelaje largo y fuerte. Las patas, plantigradas, aunque cortas y algo torpes en sus movimientos, son muy poderosas, al estar armadas con fuertes uñas adaptadas para excavar en terrenos profundos.

Especie moderadamente abundante, ocupa una gran variedad de hábitats, condicionado a la existencia de cobertura vegetal que oculte sus profundas y laberínticas madrigueras, a veces compartidas

con zorros y conejos, en las que se ocultan durante el día y la estación invernal, en la que hibernan. Se agrupan por parejas, defendiendo territorios de unas 450ha.

Omnívoro, de actividad nocturna, tiene preferencia hacia las lombrices, además de insectos, frutos, vegetales, huevos y micromamíferos; pudiendo pasar días y hasta semanas sin comer si advierte peligro cerca, ya que puede sobrevivir gracias a la grasa acumulada en sus tejidos.

Antaño habitual compañero en los paseos Aldeamayorenses, en la actualidad tan solo quedan dos o tres parejas en el municipio.



## JABALÍ (Sus scrofa)


MAMÍFERO.  
FAM. SUIDOS.  
OMNÍVORO.

Antepasado del cerdo doméstico (de 140cm y 80kg), se diferencia de él por su revestimiento de pelos duros (cerdas), coloración parda, mechón negro en la cola y colmillos curvados exteriores. Sus crías, de hasta cuatro meses, se denominan rayones, por ser pardo-amarillentos, surcados por once bandas claras.

Los jabalís se agrupan en piaras de una o varias hembras y su prole (los machos son solitarios), rebozándose en "bañas" de barro, junto a las que suele haber un árbol grande en el que se restriegan. Las camas, rellenas de vegetación, se encuentran en lugares enmarañados, con orientación de solana.

De hábitos estrictamente nocturnos, es capaz de vivir en gran variedad de medios, siempre que tengan agua, alimento y tranquilidad, con preferencia hacia el bosque. Su alimentación es omnívora y muy diversa: bellotas, piñones, castañas, patatas, cereal, setas, lombrices, insectos, sapos, pájaros, roedores,...

En España, tras la regresión sufrida hasta los años 50, ha aumentado notablemente su población, debido al desdoblamiento rural, abandono de cultivos, espesamiento del monte y disminución del ganado doméstico. Como sucede con el lobo, aquí sólo se encuentra de paso por Juarras y Casablanca en sus desplazamientos desde los montes de Montemayor y La Parrilla a Boecillo.



## CONEJO (Oryctolagus cuniculus)

MAMÍFERO.  
FAM. LEPÓRIDOS.  
HERBÍVORO.

Tamaño medio (40cm y 1.250gr); gris con tonos pardos y vientre blanco; cola corta, con la parte inferior blanco luminoso y la superior gris (negra en liebres); y orejas largas y uniformemente coloreadas (7cm, aunque menos que las liebres, y sin mancha negra). Sus patas traseras están más desarrolladas, adaptadas para la carrera, y cubiertas de pelos fuertes y elásticos que amortiguan las piedras.

Suelen vivir en grupos estables de entre dos y veinte individuos que utilizan un territorio común (5ha) y comparten una o varias madrigueras subterráneas, llamadas "vivares" o "bardos", unidas entre sí y con las cagaruteras por carriles.

Es activo sobre todo de noche, siendo la base de su dieta plantas herbáceas, pese a que en épocas secas consume vegetación leñosa, cultivos de hortalizas o cereales.

Aunque desde hace tiempo están siendo diezmados por dos graves enfermedades: la mixomatosis y la EHV, en España ha sido y es muy abundante (quizá de él procede el nombre de "tierra de conejos" con que la bautizaron los fenicios). De hecho en toda la zona Sur de Valladolid constituye casi una plaga, ocasionando graves daños sobre los cultivos, por lo que ha sido tradicionalmente la pieza más cobrada por los cazadores.



## MURCIÉLAGOS FORESTALES (Myotis/Pipistrellus sp.)

MAMÍFERO.  
FAM. VESPERTILIONÍDOS.  
INSECTÍVORO.

Los murciélagos constituyen una peculiar línea evolutiva de los mamíferos, formada por pequeños animales nocturnos que hibernan, pueden volar de sus pies cuando descansan, "ven" con las orejas y "vuelan" con las manos, llegando a realizar desplazamientos de 50km entre unos refugios y otros, en los que forman colonias de entre 50 y 200 individuos.

Poseen un complejo sistema de orientación, denominado "ecolocación", que funciona como un sónar: emiten sonidos de alta frecuencia por la boca y la nariz que, al chocar con los obstáculos, producen una serie de ecos que son recogidos por los oídos. Sus hábitos nocturnos están motivados por la

necesidad de evitar pérdidas de agua en las alas, reducir la depredación, y eludir la competencia de los reyes del cielo: las aves.

Se alimentan de insectos y otros artrópodos, siendo cierta, pero poco probable, su capacidad de transmitir la rabia. Aunque relativamente abundantes, están estrictamente protegidos, al estar catalogados en su mayoría como "especies vulnerables".

Su heredada mala fama es totalmente injustificada, pues son sumamente beneficiosos para el hombre; además, con 980 especies en el mundo, su diversidad es sólo superada por los roedores, lo que dice mucho y bien de su éxito evolutivo.



## ARDILLA (Sciurus vulgaris)

MAMÍFERO.  
FAM. CÁNIDOS.  
OMNÍVORO.

Roedor exclusivamente arborícola, del que se cuenta que antaño podía atravesar la Península Ibérica saltando de copa en copa. Gracioso mamífero de tamaño medio (22cm y 300gr), pelaje con dominio de tonos rojizos, hocico corto, ojos oscuros muy grandes y vivos, orejas acabadadas en un penacho de pelos largos, patas traseras más desarrolladas y garras afiladas. Su cola, larga y muy poblada, le sirve a la vez de timón y contrapeso en sus ágiles movimientos.

Es una especie típicamente forestal, abundante aunque solitaria, y muy fácil de observar o detectar por sus indicios. Construye nidos esféricos con hojas y ramas en los huecos de los troncos o en la copa

de los árboles. Su área de campeo es de entre dos y diez hectáreas.

De hábitos diurnos, se alimenta fundamentalmente de frutos y semillas; de hecho los piñones constituyen la base de su dieta, al ingerir cada día los de 125 piñas (40gr), aunque en ocasiones llegue a incluir algunos huevos y pollos dentro de su menú. Muy inquieta, reduce su actividad en épocas de frío o calor extremos, por lo que prefiere las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde.

Pese a que resulta difícil de crear, gozó de interés culinario en la época de los romanos.



## ÁGUILA CALZADA (Hieraaetus pennatus)

AVE.  
FAM. ACCIPITRIDOS.

Rapaz de tamaño medio (47cm y 120cm de envergadura), es la más pequeña de todas las águilas. Sus ejemplares, independientemente del sexo, pueden tomar dos fases de coloración: una clara, con alas blancas y negras; y otra oscura, de color uniforme castaño-oscuro.

Migradora como visitante estival, nidifica en la Península entre los meses de Abril y Septiembre.

Ampliamente distribuida y con población en aumento, tanto en Iberia como en el propio Aldeamayor de San Martín, en donde llegan a aparecer hasta ocho parejas, construyendo el nido en árboles, alimentándose principalmente de aves de pequeño y mediano tamaño, estando también especializada en la captura de lagartos y conejos.



## RATONERO COMÚN (Buteo buteo)

AVE.  
FAM. ACCIPITRIDOS.

Rapaz de tamaño algo mayor al del águila calzada, milano, azor y gavilán (54cm y 120 de envergadura), con plumaje variable: desde blanquecino hasta pardo oscuro, siendo generalmente claro por debajo y oscuro por encima, con cola estriada abierta en abanico, pico amarillo con la punta negra y patas amarillentas.

Sedentario muy abundante, más tras la numerosa llegada de aves europeas en invierno, gusta de

hábitats en mosaico, construyendo los nidos en árboles de gran porte y posándose en postes junto a las carreteras para localizar sus presas.

Su alimento se basa en ratones, otros roedores y algún que otro reptil, con baja incidencia sobre las especies cinegéticas, por lo que resulta altamente beneficioso para el hombre.



## BÚHO CHICO (Asio otus)

AVE.  
FAM. ESTRÍGÍDOS.

Rapaz pequeña (36cm y 95cm de envergadura), más alta y delgada si se alza. Fácilmente reconocible por su color pardo-rojizo, con rayado oscuro, orejas prominentes, ojos naranjas, pico gris, y cabeza con giro de hasta 270 grados.

Sedentario y ampliamente distribuido, presenta un comportamiento estrictamente nocturno, ayudándose

de su sensible vista y oído. Se alimenta de pequeños mamíferos, aunque en ocasiones también de peces, cangrejos, o insectos, que traga enteros, expulsando al exterior las partes no digeribles formando bolas conocidas como "egagrópias".

En Aldeamayor es muy frecuente, como sus parientes los mochuelos, autillos y cárabos, habitando en pinares próximos a cultivos de cereal.



## ABEJARUCO (Merops apiaster)

AVE.  
FAM. MERÓPIDOS.

De reducidas dimensiones (28cm y 46cm de envergadura), resulta inconfundible por su plumaje multicolor, en el que se combinan amarillos, verdes, azules y rojizos, convirtiéndole en el ave más bella de la región.

Migradora nidificante, llega de África en abril formando ruidosos y coloridos bandos, que suelen posarse sobre los cables.

Construye sus nidos, formando colonias de varias decenas de parejas, en orificios excavados en taludes arenosos, frecuentes en extracciones de áridos abandonadas (como el norte de la Alenera de Compasco), para evitar el acceso de depredadores (culebras, comadrejas y lagartos).

Se alimenta de insectos voladores que captura en el aire, regurgitando también "egagrópias" con sus restos.



## ABUBILLA (Upupa epops)

AVE.  
FAM. UPUPÍDOS.

Su pequeño tamaño (27cm y 44cm de envergadura) es compensado por su irresistible belleza, que recuerda a una mariposa por su plumaje anaranjado, alas blancas y negras, largo pico curvado hacia abajo, y singular cresta, naranja con la punta negra, que forman las plumas de la cabeza. Esta le sirve para comunicarse, pues se pliega hacia atrás si está tranquila, y se despliega en abanico en caso de alerta.

Nida en agujeros de árboles o en los abandonados por pájaros carpinteros, característicos por su hediondo olor, que sirve como defensa frente a predadores.

De amplia presencia, es una especie nidificante estival, aunque muchas son sedentarias en lugares cálidos, alimentándose durante todo el día de insectos, gusanos y larvas que alcanza con su pico.



## PICO PICAPINOS (Dendrocopos major)

AVE.  
FAM. PÍCIDOS.

El "pájaro carpintero" tiene un porte algo menor que los anteriores (22cm y 36cm de envergadura), y, sin llegar a su nivel, también es muy vistoso: pecho totalmente blanco, con zona anal roja, alas negras con manchas blancas, y nuca roja sólo en machos.

Como no puede ser de otro modo, su pico, en forma de cincel, es extremadamente potente, al igual que los músculos del cuello. Así su cabeza

está protegida frente a los impactos, ya que llega a dar unos 10.000 picotazos diarios en su "tamborileo" al construir el nido.

Sedentaria nidificante, muy abundante y extendida, territorial y agresiva, está ligada a los grandes troncos de árboles adultos. Se alimenta de insectos (controlador de plagas), vegetales o miel, almacenando los excedentes para épocas de escasez.



## URRACA, RABILARGO, GRAJILLA Y CORNEJA

AVES.  
FAM. CÚRVIDOS.

Fuera del estereotipo marcado por cornejas, totalmente negras, o grajillas, de nuca gris; existen córvidos realmente bellos: la urraca o "marica", de irisaciones verde-azuladas, o el rabilargo, con cabeza negra, garganta blanca, y alas y cola azules.

Sedentarias, proliferan cada vez más en nuestros montes. En un intento por proteger las especies cinegéticas se persiguió a quienes las incluían en su

dieta; así águilas, azores o búhos fueron diezmados, acabando de paso con los controladores poblacionales de los córvidos que ahora, dado su oportunismo y adaptabilidad al medio y al hombre, campan a sus anchas devorando los pollos y huevos de aquellos a los que se quería proteger. Sociales, gregarios y omnívoros, también se alimentan de basura, carroña, frutos y semillas.



## LAGARTO OCELADO (Lacerta lepida)

REPTIL.  
OMNÍVORO.

Es, sin lugar a dudas, el gigante de los saurios europeos, pues en la etapa adulta llegan a alcanzar más de medio metro de longitud, e incluso 90cm de peso.

Posee un aspecto fascinante, ya que su cuerpo, verde-amarillento, está surcado por dos filas de grandes círculos u "ocelos" de color azul claro.

Muy territoriales y agresivos, en caso de peligro tienen la capacidad de desprenderse de la cola.

Son ágiles y rápidos de movimientos, pudiendo trepar a los árboles. Su alimentación es omnívora, predominando los insectos, algunos vertebrados, e incluso frutos que recoge en las horas de mayor calor.

Relativamente abundantes en espacios con vegetación y bien soleados, necesitan para desarrollarse tanto del calor como del alimento.



## CULEBRA DE ESCALERA (Elaphe scalaris)

REPTIL.  
CARNÍVORO.

También tiene un tamaño considerable, al superar con facilidad el metro de longitud. Sin embargo la característica que la hace especial es el singular diseño de su torso: sobre el pardo oscuro general destaca un dibujo en forma de escalera que permanece hasta los 4 años; a partir de esa edad van desapareciendo los "pedaños", presentando la culebra adulta tan solo dos rayas negras longitudinales.

Vive en zonas secas y bien expuestas al sol, sube con frecuencia a lo alto de los árboles.

Rápida y ágil, es bastante agresiva y posee un apetito insaciable, estando especializada en la captura de pequeños roedores y aves, sobre todo pollos, que coge de los propios nidos, aunque de adulto puede llegar a cazar conejos.

## CONSEJOS



NO tires basura



NO hagas fuego



NO en coche



NO cojas plantas



NO cojas animales



SI a pie o en bici



SI sonrre

### SUBVENCIÓN

**Junta de Castilla y León**  
Consejería de Economía y Empleo  
Subvenciones públicas destinadas a la mejora y recuperación del hábitat minero. Año 2007



### INFORMACIÓN:

Servicio Técnico Municipal de Medio Ambiente. Excmo. Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín. Pza. Mayor, 1; 47162 Aldeamayor de San Martín (Valladolid). Telf.: 983.55.81.95 Fax: 983.55.82.10 Mail: ayto.aldeamayor@dipl-valladolid.es Juan Diego Rivera Calvo (Ingeniero de Montes, I.T. Forestal Ayto.)